

意見書（医師用）

保育園は乳幼児が集団で長時間生活をする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで子どもたちが1日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態をみて、集団での園生活が可能な状態となってから登園可能の判断をお願いいたします。

なお、こども園での集団生活に適用の登園であるようご配慮ください。

 とりのきくじら保育園 施設長

 園児名

病名 「 _____ 」

 年 月 日 から症状も回復し、集団生活に支障がない状態
 になったので登園を可能と判断します。

 年 月 日

医療機関 _____

医師名 _____ 印

登園届（保護者記入）

保育園は乳幼児が集団で長時間生活をする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが1日快適に生活できることが大切です。

園児がよくかかる下記の感染症については、登園の目安を参考にかりつけの医師の診断に従い、登園の際には、登園届の提出をお願いいたします。なお、園での集団生活に適用できる状態に回復してから登園するようご配慮ください。

 とりのきくじら保育園 施設長

 園児名

病名 「 _____ 」 と診断され、

 年 月 日 医療機関 「 _____ 」 において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

 保護者名 _____ 印

※とびひ、アタマジラミ、水いぼは意見書・登園届は必要ありませんが、必ず受診し医師の判断で患部を覆う等の処置後登園をお願いします。
 プール期間中はプール遊びの可否についても医師に聞いてください。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|-----------------------------|--|--|
| 麻疹(はしか) | 発症1日前から発しん出現後の4日後まで | 解熱後3日を経過してから |
| インフルエンザ | 症状がある期間(発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した翌日から5日間かつ解熱した翌日から3日間は登園停止となる。 |
| 風しん | 発しん出現の前7日から後7日間くらい | 発しんが消失してから |
| 水痘(水ぼうそう) | 発しん出現1日～2日前から痂皮形成まで | すべての発しんが痂皮化してから |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺の腫脹が消失してから |
| 結核 | | 感染のおそれがなくなってから |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、充血等症状が出現した数日間 | 主な症状が消え2日経過してから |
| 流行性角結膜炎(はやり目) | アデノウイルスが原因。アデノウイルスに感染してからおよそ5日～2週間 | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後は医師の指示に従う) |
| 腸管出血性大腸菌感染症(○157.○26.○111等) | 菌に汚染された飲食物を摂取したり菌に汚染された排泄物を処理したりした後4日～8日 | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |

| 病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後24～48時間経過していること |
| マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
| ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
| ヘルパンギーナ | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出しているため注意が必要) | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
| 帯状疱疹 | 水泡を形成している間 | すべての発しんが痂皮化してから |
| 突発性発しん | | 解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと |